

	<b>MANUAL CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA</b>			
	<b>GUIA:</b>		<b>ABSCESO DENTAL</b>	
Levantamiento: Agosto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: G-CE-0-01	Página: - 1 - de 3	Versión: 01

<b>ABSCESO DENTAL</b>
<b>1. ALCANCE</b>
Esta guía es aplicable a la totalidad de la población que acude a la E.S.E Jenesano, tanto niños, jóvenes como adultos.
<b>2. SERVICIO Y POBLACION</b>
Servicio de odontología en la atención en consultorio de la E.S.E Jenesano y/o extramural, a la población del municipio del Jenesano.
<b>3. PERIODICIDAD</b>
La guía se revisara cada cinco años y/o según necesidad.
<b>4. EPIDEMIOLOGIA</b>
Según estudios recientes, la prevalencia actual en países industrializados es de un 0,5%. Dicha prevalencia aumenta hasta un 26,9% en países en desarrollo. En el municipio de Jenesano encontramos que el absceso dental ocupa el quinto lugar en las causas de morbilidad. Siendo un factor predisponente la desnutrición y los malos hábitos de higiene oral.
<b>5. DEFINICION DE LA PATOLOGIA</b>
Un absceso dental es una acumulación de pus (material infectado) en un diente o encía provocado por una infección bacteriana. Hay dos tipos de abscesos dentales: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absceso periapical (pulpa de origen endodontico)</li> <li>▪ Absceso gingival o periodontal puede ser supurativa o no.</li> </ul>
<b>6. MANIFESTACIONES CLINICAS</b>
Un absceso dental comienza cuando las bacterias invaden e infectan un diente, favoreciendo la formación y acumulación de material purulento.
Las condiciones que favorecen la formación de un absceso son: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caries dental cavitacional</li> <li>▪ Enfermedad periodontal crónica</li> <li>▪ Patología pulpar</li> </ul>
<b>Síntomas</b>
Los Síntomas incluyen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dolor pulsátil y persistente en un diente o encía</li> <li>▪ Dolor provocado y aumentado con la masticación.</li> <li>▪ Enrojecimiento, sensibilidad e inflamación de las encías</li> <li>▪ Adenopatías regionales</li> <li>▪ Presencia de inflamación, rubor, calor, tumor, deformación de contorno</li> <li>▪ Halitosis</li> <li>▪ Ocasionalmente puede presentarse limitación de apertura.</li> <li>▪ Si no se atiende, las complicaciones de un absceso dental pueden incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pérdida del diente</li> <li>▪ Diseminación de la infección a tejidos o huesos circundante</li> </ul> </li> </ul>
<b>7. FASE DIAGNOSTICA</b>
El odontólogo le interrogará al paciente acerca de los síntomas e historial médico, además de realizarle un examen detallado de sus dientes y encías.

	<b>MANUAL CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA</b>			
	<b>GUIA:</b>		<b>ABSCESO DENTAL</b>	
Levantamiento: Agosto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: G-CE-0-01	Página: - 2 - de 3	Versión: 01

El examen incluirá pruebas de dolor y sensibilidad en el diente:

- Percusión horizontal y vertical
- Pruebas de sensibilidad (calor, frio, electricidad)
- Prueba de palpación intraoral y extraoral
- Toma de radiografías en caso necesario

### **8. FASE TERAPEUTICA**

#### **ADULTOS**

Analgésico para manejo del dolor

- Acetaminofen → Tabletas 500mg Tomar 1 cada 6 horas por 5 días
- Ibuprofeno → Tabletas 400mg Tomar 1 cada 6 horas por 5 días
- Naproxeno → Tabletas 250mg Tomar 1 cada 6 horas por 5 días, Tabletas 500mg Tomar 1 cada 12 horas por 5 días

Antibiótico para control de la infección

- Amoxicilina → Tabletas 500mg Tomar 1 cada 8 horas por 7 días
- Cefalexina + Metronidazol → Cefalexina → Tabletas 500mg Tomar 1 cada 6 horas por 7 días, Metronidazol → Tabletas 500mg Tomar 1 cada 8 horas por 7 días
- Eritromicina → Tabletas 500mg Tomar 1 cada 6 horas por 7 días
- Clindamicina → Tabletas 300mg Tomar 1 cada 6 horas por 7 días

#### **NIÑOS**

Analgésico para manejo del dolor

- Acetaminofen →  
Jarabe 150mg/5ml Tomar 15mg/Kg cada 6 horas por 6 días  
Gotas 30 = 100mg Tomar gotas según peso cada 6 horas por 6 días
- Ibuprofeno →  
Suspensión 100mg/5ml Tomar 6mg/Kg cada 6 horas por 6 días

Antibiótico para control de la infección

- Amoxicilina → Jarabe 250mg/5ml Tomar 50mg/kg/día cada 8 horas por 7 días
- Cefalexina → Jarabe 25mg/5ml Toma 50mg/Kg/día cada 8 horas por 7 días

### **9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REMISIÓN**

No serán de manejo por parte de odontólogo general los abscesos en los siguientes casos:

- Pacientes con compromiso sistémico, es decir que presenten fiebre, adinamia, astenia.
- Abscesos que involucren más de dos espacios aponeuróticos.
- Abscesos que se encuentren en espacios aponeuróticos inferiores que estén causando obstrucción de la vía aérea.
- Pacientes tratados clínicamente por odontólogo general y que no presentan mejoría, incluso después de haberle sido suministrado determinados antibióticos.

Los casos anteriormente mencionados deberán ser tratados hospitalariamente.

### **10. RECOMENDACIONES**

La mayoría de los abscesos dentales pueden ser prevenidos con:

- Higiene dental adecuada

- Uso de hilo dental entre dientes y encías
- Revisión dental general periódica (cada seis meses)
- Limpieza dental profesional en forma periódica (cada seis meses)
- Disminuir la ingesta de azúcar para prevenir la formación de cavidades

Si el absceso proviene de caries dental o ruptura en el diente:

- Se anestesia la zona adyacente al absceso
- Se localiza el área de drenaje y se incide sobre él
- Se realiza presión digital
- Se coloca dren, esto sólo si se manejan tejidos blandos
- Si se requiere terapia pulpar, se realizará apertura en el diente que corresponda
- Lavado y desinfección del o los conductos
- Evitar al máximo la instrumentación de los conductos para no exacerbar dicha patología
- Colocar cemento temporal.
- Medicación con antibiótico y analgésico

Si el absceso es debido a una infección gingival o periodontal

- El absceso se drena y se limpia cuidadosamente.
- Se realiza curetaje de los dientes afectados
- Mantenimiento de bolsas periodontales
- Medicación con antibiótico y analgésico

La extracción dental puede ser requerida si

- La caries y/o la infección dental es demasiado extensa y no se puede rehabilitar o hacer endodoncia.
- Diente no rehabilitable, o con pronóstico malo por enfermedad periodontal

## 11. ALGORITMO

